



EVIDÊNCIA DE MUNDO REAL:

SINTOMAS SUGESTIVOS DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (ssITU) ENTRE USUÁRIOS DE CATETERES VESICAIS INTERMITENTES

Atualmente, existe uma carência de dados sobre a segurança de diferentes tipos de CVI, particularmente sobre cateteres hidrofílicos ou pré-lubrificados.

Sendo assim, a rotina de pacientes de CVI foi avaliada e o perfil de segurança dos dois grupos de cateteres foi comparada.

Dados retrospectivos de mundo real de uma base de dados do



ssITU identificados na base de dados

Prescrição de antibióticos não específicos + Diagnóstico relacionado à ITU
OU
Prescrição de antibióticos específicos para ITU


Parâmetros de análise



- Ocorrência de pelo menos um ssITU
- Número de ssITU por paciente


RESULTADOS NA POPULAÇÃO TOTAL PAREADA DURANTE O PERÍODO DE EXPOSIÇÃO

Ocorrência de pelo menos um ssITU



Proporção similar de pacientes com pelo menos um ssITU nos dois grupos.

Número de ssITU por paciente



Significativamente menos ssITU por paciente no grupo pré-lubrificado em relação ao grupo hidrofílico.